

KULLANMA TALİMATI

KOMBEVİT-C draje

Ağız yolu ile uygulama içindir.

- **Etkin madde:** 15 mg Tiamin mononitrat (Vitamin B₁), 15 mg Riboflavin (Vitamin B₂), 10 mg Piridoksin hidroklorür (Vitamin B₆), 50 mg Niyasinamid, 25 mg Kalsiyum pantotenat, 0.01 mg Siyanokobalamin (Vitamin B₁₂), 0.25 mg Folik asit ve 100 mg Askorbik asit (Vitamin C) içermektedir.
- **Yardımcı madde(ler):** Polivinil pirolidon, Talk, Magnezyum stearat, Şeker, Şellak, Titanyum dioksit, Jelatin, Arap zımkı, F.D. & C Sarı no. 6, Ewax, Kalsiyum karbonat.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de KOMBEVİT-C'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **KOMBEVİT-C nedir ve ne için kullanılır?**
2. **KOMBEVİT-C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **KOMBEVİT-C nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **KOMBEVİT-C'nin saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. KOMBEVİT-C nedir ve ne için kullanılır?

KOMBEVİT-C birden fazla vitamin içeren bir ilaçtır. Her bir karton kutu, 30 draje içermektedir.

KOMBEVİT-C vitaminler adı verilen tedavi grubu altında sınıflandırılır.

KOMBEVİT-C, B grubu vitaminleri ve C vitamini eksikliğine bağlı olarak görülen durumlarda tedaviye yardımcı olarak kullanılır.

2. KOMBEVİT-C'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

KOMBEVİT-C'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– Geçmişte KOMBEVİT-C'nin içindeki etkin maddelerine veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyonunuz olduysa.

KOMBEVİT-C'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Bazı kansızlık durumlarında (pernisiyöz anemi ve diğer megaloblastik anemilerde) kullanılmamalıdır.

B₁₂ vitamini tam bir teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki B₆ vitamini, emziren kadınlarda süt salgısını azaltabilir.

Göz problemi (duyu kaybı) olan kişilerde siyanokobalamin kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C alındıktan sonra idrarın sarıya boyanması, ilacın içerdiği Riboflavin (Vitamin B₂)'den ileri gelmekte olup tamamen zararsız bir belirtidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

KOMBEVİT-C'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

KOMBEVİT-C'yi yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

KOMBEVİT-C emziren kadınlarda dikkatli kullanılmalıdır.

KOMBEVİT-C doktorunuzun kontrolü altında kullanılabilir.

Araç ve makine kullanımı

KOMBEVİT-C'nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

KOMBEVİT-C'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

KOMBEVİT-C şeker içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

KOMBEVİT-C içeriğindeki F.D. & C Sarı no. 6 (bir tür boyar madde), alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

INH (tüberküloz tedavisinde kullanılan bir ilaç), sikloserin ve oral kontraseptifler (ağız yoluyla kullanılan doğum kontrol ilaçları) B₆ vitamini ihtiyacını arttırmırlar.

Parkinson vakalarında levodopa tedavisi üzerindeki bozucu etkisinden dolayı B₆ vitamini kullanılmamalıdır.

KOMBEVİT-C içeriğindeki niasin, acil yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir gruba ait ilaçların (ganglionerjik blokerlerin) tansiyon düşürücü etkisini arttırır.

KOMBEVİT-C, Ehrlich reaktifi kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.

Simetidin ve ranitidin (ülser tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan ilaçlar) B₁₂ emilimini azaltır. Omeprazol (ülser ve reflü tedavisinde kullanılan, mide asidini azaltan bir ilaç), B₁₂ vitamininin emilimini etkiler. Kolşisin (gut hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç) B₁₂ vitamininin emilimini azaltır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. KOMBEVİT-C nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Erişkinler için günlük ortalama doz 2-3 drajedir.

Ancak doktorunuz hastalığınızın türüne ve şiddetine göre dozunuzu belirleyecektir.

• Uygulama yolu ve metodu:

Ağız yoluyla uygulanır. KOMBEVİT-C drajeleri bir bardak su ile yutarak alınız. Drajeleri çiğnemeyiniz.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

Doktor tarafından önerilmedikçe çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Farklı doz uygulamasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

• Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Hafif-ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliği durumlarında doz azaltılması konusunda herhangi bir bilgi yoktur.

Eğer KOMBEVİT-C'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla KOMBEVİT-C kullandıysanız:

KOMBEVİT-C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

KOMBEVİT-C'yi kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

KOMBEVİT-C ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

KOMBEVİT-C tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi KOMBEVİT-C'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Çok seyrek

Alerjik reaksiyonlar

Bilinmiyor

Uyuşma (parestezi)

Uyku hali

Bu yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. KOMBEVİT-C'nin saklanması

KOMBEVİT-C'yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru yerde saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KOMBEVİT-C'yi kullanmayınız.
Eğer ürünün ambalajında herhangi bir hasar fark ederseniz KOMBEVİT-C'yi kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.
No:1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL
Tel: 0212 692 92 92
Faks: 0212 697 00 24

İmal Yeri:

Deva Holding A.Ş.
Gültepe Kavşağı No: 199/A 4. Levent/İstanbul

Bu kullanma talimatı .../.../..... tarihinde onaylanmıştır.