

KULLANMA TALİMATI

MUCOLATOR PLUS 600 mg Toz İçeren Saşe

Ağızdan alınır.

- **Etkin madde:** Her bir saşede, 600 mg asetilsistein
- **Yardımcı maddeler:** Aspartam, sorbitol, betakaroten, portakal aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **MUCOLATOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MUCOLATOR PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MUCOLATOR PLUS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MUCOLATOR PLUS'ın saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MUCOLATOR PLUS nedir ve ne için kullanılır?

MUCOLATOR PLUS'ın etkin maddesi bir mukolitik (balgam kıvamını azaltarak atılımını kolaylaştırıcı) olan asetilsisteindir.

MUCOLATOR PLUS 600 mg asetilsistein içeren, kağıt/alüminyum/polietilen ambalaj içinde, 10 ve 30 adet saşe içeren kutularda bulunur.

MUCOLATOR PLUS, aşağıdaki hastalıklarda endikedir:

- Yoğun kıvamlı balgamın kıvamının azaltılarak atılması
- Balgam sökülmesinin kolaylaştırılması gereken bronkopulmoner hastalıklarında
- Yüksek doz parasetamol kullanımı ile oluşan karaciğer yetmezliğinin önlenmesinde

2. MUCOLATOR PLUS'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MUCOLATOR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

- Asetilsisten veya MUCOLATOR PLUS'ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,
- Aspartam içeriğinden dolayı fenilketonüri hastalığınız varsa
- Sorbitol içerdiğinden dolayı nadir görülen, kalımsal fruktoz intoleransı probleminiz varsa

MUCOLATOR PLUS'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

- Astımınız varsa
- Öksürmede zorlanıyorsanız
- Mide ülseriniz varsa
- Karaciğer yetmezliğiniz varsa
- Böbrek yetmezliğiniz varsa

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

MUCOLATOR PLUS'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

MUCOLATOR PLUS'ın yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Aç ya da tok alınabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOLATOR PLUS gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüse verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MUCOLATOR PLUS'ı emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

MUCOLATOR PLUS'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

MUCOLATOR PLUS içeriğinde aspartam bulunur. Fenilalanin için bir kaynak içerdiğinden fenilketonüri adı verilen kalımsal hastalıkta kullanılmamalıdır.

MUCOLATOR PLUS içeriğinde 1980.0 mg sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki antibiyotiklerden birini veya birkaçını kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

- Penisilinler
- Sefalosporinler
- Tetrasiklinler
- Aminoglikozitler
- Makrolidler
- Amfoterisin B

- Antitüssifler (öksürüğe karşı kullanılan ilaçlar)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MUCOLATOR PLUS nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonun atılımını kolaylaştırmak amacıyla günde 1 kez 1 saşe uygulanır.

Parasetamol zehirlenmesinde : Yükleme dozu olarak 140 mg/kg ; idame dozu olarak ise 70mg/kg 4 saatte bir olmak üzere 17 doz uygulanır, (ancak, bu amaçla esas olarak injeksiyonluk çözelti kullanılır.).

Uygulama yolu ve metodu:

Bir su bardağı içine saşe boşaltılır ve yarısına kadar su ile doldurulur. Karıştırılarak çözülür. Opelesan (saydam olmayan) görünümdeki çözelti oral olarak kullanılır. Hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı ve kalan kısım atılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

14 yaşın altındaki çocuklarda ve günlük dozun bölünmesi gereken durumlarda “MUCOLATOR Toz İçeren Saşe 200 mg” formu kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanım:

Erişkinler için belirlenmiş olan doz uygulanır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

MUCOLATOR PLUS böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer yetmezliği

Şiddetli karaciğer yetmezliği veya SİROZU olanlarda ilacın atılımı önemli oranda azalır, o nedenle bu hastalarda doz azaltılarak dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer MUCOLATOR PLUS'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MUCOLATOR PLUS kullandıysanız:

MUCOLATOR PLUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozda mide yanması, kusma, ishal oluşabilir.

MUCOLATOR PLUS'ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MUCOLATOR PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

MUCOLATOR PLUS tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MUCOLATOR PLUS'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa MUCOLATOR PLUS'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Şiddetli alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, döküntü, soluk almada güçlük, kan basıncında düşme)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Şiddetli kusma ve bulantı
- Şiddetli karın ağrısı ve ishal
- Ağızda yara

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz :

- Hafif bulantı, kusma
- Hafif karın ağrısı, ishal
- Baş ağrısı

Bunlar MUCOLATOR PLUS'ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MUCOLATOR PLUS'ın saklanması

MUCOLATOR PLUS'ı çocukların göremeyeceđi, erişemeyeceđi yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25° C'nin altında oda sıcaklıklarında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra MUCOLATOR PLUS'ı kullanmayınız.

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz MUCOLATOR PLUS'ı kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri : KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdađ

Bu kullanma talimatı 23.11.2010 tarihinde onaylanmıřtır.