

KULLANMA TALİMATI

DEXTRCİN® %2 pomad

Haricen kullanılır.

- *Etkin madde:* %2 a/a mupirosin içerir.
- *Yardımcı maddeler:* Polietilen glikol.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. *DEXTRCİN nedir ve ne için kullanılır?*
2. *DEXTRCİN ' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler*
3. *DEXTRCİN nasıl kullanılır?*
4. *Olası yan etkiler nelerdir?*
5. *DEXTRCİN ' in saklanması*

Başlıkları yer almaktadır.

1. DEXTRCİN nedir ve ne için kullanılır?

DEXTRCİN , beyaz renkli bir pomaddır, aktif madde olarak %2 a/a oranında mupirosin içeren 15 g'lık tüp halinde bulunmaktadır. DEXTRCİN aynı zamanda aktif olmayan polietilen glikol içerir.

DEXTRCİN sadece cilt üzerinde kullanılan bir antibiyotiktir ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının tedavisi için kullanılır.

2. DEXTRCİN' i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEXTRCİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

- DEXTRCİN'i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesiniz ve doktorunuza söyleyiniz.
- Mupirosin veya polietilen glikole karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

DEXTROCİN 'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Eđer daha önceden DEXTROCİN'in içindeki maddelerden herhangi birini içeren başka bir pomada karşı alerjik reaksiyon (döküntü gibi) gösterdiyseniz, DEXTROCİN kullanmadan önce doktorunuzla konuşunuz.
- Polietilen glikol içeren diđer pomalarda olduđu gibi, DEXTROCİN'i de, özellikle bir böbrek hastalığınız varsa, hasarlı veya çatlamıř geniş alanlara uygulamayınız.

DEXTROCİN' i göz veya burun mukozasına temas ettirmeyiniz. Eđer kazara gözünüze kaçtıysa, gözünüzü bol suyla iyice yıkayınız.

Eđer pomad herhangi bir rahatsızlık hissine yol açarsa, kullanmayı kesiniz, etkilenen alanı suyla iyice yıkayınız ve doktorunuzla görüşünüz. Doktorunuza pomadın tüpünü gösteriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DEXTROCİN 'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli deđildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eđer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz size söylemedikçe hamileyken DEXTROCİN' i kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eđer bebeđinizi emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. DEXTROCİN' i meme başına sürüyorsanız, bebeđinizi emzirmeden önce tam olarak temizleyiniz.

Araç ve makine kullanımı

Bu ilaç araç veya makine kullanma yeteđinizi etkilemez.

DEXTROCİN' in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DEXTROCİN polietilen glikol içermektedir. Bu nedenle orta şiddette veya ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza söyleyiniz.

Diđer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DEXTROCİN diđer krem veya merhemlerle karıştırılmamalıdır. Bunlar DEXTROCİN' in işleyişini engelleyebilirler.

Eđer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. DEXTROCİN nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

DEXTROCİN genellikle 10 gün boyunca, günde iki ila üç kez sürülür. Doktorunuz ilacı ne kadar sıklıkla sürmeniz gerektiğine karar verecektir.

DEXTROCİN' i doktorunuzun size tavsiye ettiği süre zarfında kullanınız. Eğer 7 günde bir iyileşme görmezseniz, doktorunuza danışınız.

Doktorunuz size aksini söylemedikçe 10 günden daha uzun bir süre tedaviye devam etmeyiniz.

Uygulama yolu ve metodu:

Az miktarda DEXTROCİN' i etkilenmiş bölgeye sürünüz. Pomadın sürüldüğü bölge bir örtü ile örtülebilir.

Pomadı kullanmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları:

- **Çocuklarda kullanım:** Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
- **Yaşlılarda kullanım:** Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Özel kullanım durumları:

Bkz: DEXTROCİN 'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Eğer DEXTROCİN 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEXTROCİN kullandıysanız

Bu ilaçla aşırı doz problemleri olası değildir.

DEXTROCİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEXTROCİN'i kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı sürmeyi unutursanız, hatırlar hatırlamaz sürünüz. Daha önceki gibi uygulamaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEXTROCİN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi DEXTROCİN' in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler görülebilir.

Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın: 10 kişide 1'den fazla

Yaygın: 10 kişide 1'den az, 100 kişide 1'den fazla

Yaygın olmayan: 100 kişide 1'den az, 1.000 kişide 1'den fazla

Seyrek: 1.000 kişide 1'den az, 10.000 kişide 1'den fazla

Çok seyrek: 10.000 kişide 1'den az
Bilinmiyor:Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler:
-Uygulama yerinde bölgesel yanma

Yaygın olmayan yan etkiler:
-Kaşıntı, eritem, uygulama yerinde bölgesel batma ve kuruma. Pomad bazına veya mupirosine karşı deri hassasiyeti reaksiyonları

Çok seyrek görülen yan etkiler:
-Sistemik alerjik reaksiyonlar

DEXTROCİN ile oluşan yan etkiler genellikle hafiftir. Çok az kişide bazı istenmeyen etkiler görülmüştür. Bunlar, kaşıntı, yanma hissi, kızarıklık, batma, karıncalanmadır (pomadın sürüldüğü bölgede görülen). Alerjik cevaplar (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) seyrek olarak rapor edilmiştir.

Eğer bu yan etkilerden birini fark ederseniz veya DEXTROCİN kullanırken başka problemlerle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. DEXTROCİN'in saklanması

DEXTROCİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C'nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEXTROCİN 'i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Mahmutbey Mah. Dilmenler Cad. No:19 Bağcılar / İstanbul

Üretim Yeri:

Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Mah. Fatih Blv. No:32 ÇOSB- Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatı 19.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.